

Pr addyi<sup>®</sup>  
(flibansérine)  
comprimés de 100mg

## Commencer le traitement par Pr ADDYI<sup>®</sup>



ADDYI (flibansérine) est utilisé dans le traitement du trouble lié à la baisse du désir sexuel chez la femme, c'est à dire une diminution de la libido présente de 75 à 100 % du temps depuis au moins six mois, et qui est la source de souffrance psychologique ou de problèmes relationnels. La baisse de libido ne doit pas être attribuable à un problème de nature médicale ou psychologique, à des problèmes relationnels ou aux effets d'un médicament ou d'une autre substance.

ADDYI est utilisé chez les femmes pré et naturellement ménopausées, âgées de 60 ans ou moins, qui :

- n'ont jamais présenté une faible libido par le passé; et
- ont une faible libido, peu importe le type d'activité sexuelle, la situation ou le partenaire sexuel.

# Qu'est-ce que le trouble lié à la baisse du désir sexuel?

Le trouble lié à la baisse du désir sexuel est un trouble caractérisé par une diminution de la libido présente de 75 à 100 % du temps depuis au moins six mois, qui est la source d'une souffrance psychologique ou de problèmes relationnels.

Le trouble lié à la baisse du désir sexuel est médicalement reconnu depuis une cinquantaine d'années et touche de nombreuses femmes comme vous. *Votre cas n'est pas unique.*



Le trouble lié à la baisse du désir sexuel est le type de dysfonction sexuelle **le plus fréquent** chez la femme.



Dans le cas du trouble lié à la baisse du désir sexuel, la diminution de la libido persiste, peu importe le type d'activité sexuelle, la situation ou le partenaire sexuel.

# Pourquoi ADDYI?

- ADDYI est utilisé dans le traitement du trouble lié à la baisse du désir sexuel chez les femmes pré et naturellement ménopausées, âgées de 60 ans ou moins.
- Il est prescrit lorsqu'une femme est confrontée à une diminution de la libido présente de 75 à 100 % du temps depuis au moins six mois, ce qui provoque des difficultés relationnelles.
- ADDYI n'améliore pas la performance sexuelle.
- Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin a peut-être utilisé une liste de vérification qui comprend des questions spécifiques, afin de s'assurer qu'ADDYI vous convient.

Voici Addyi®  Une petite pilule rose\*

\* Ne correspond pas à la taille réelle

## Comment prendre ADDYI



- Prenez ADDYI exactement comme vous l'a prescrit votre médecin : **un comprimé par jour, uniquement au coucher.**
- Ne prenez pas plus que la dose prescrite par votre professionnel de la santé.
- Ne prenez jamais ADDYI à un autre moment de la journée. La prise d'ADDYI à un autre moment qu'au coucher pourrait occasionner :
  - une hypotension,
  - un évanouissement (perte de conscience)
  - une très grande fatigue.
- Si vous avez oublié une dose d'ADDYI, prenez la dose suivante au coucher le lendemain. Ne prenez pas ADDYI le lendemain matin. Ne doublez pas la dose suivante.

Consultez votre médecin si ADDYI n'améliore pas les symptômes de votre trouble lié à la baisse du désir sexuel en l'espace de huit semaines.

# Mises en garde et précautions importantes

- ADDYI peut causer de l'hypotension grave et des évanouissements.
- Prenez ADDYI au coucher. Si vous êtes étourdie avoir pris ADDYI, allongez-vous immédiatement. Boire de l'alcool près du moment de la prise d'ADDYI peut augmenter le risque d'hypotension grave et d'évanouissement.
- ADDYI peut causer la sédation et la somnolence. Après avoir pris ADDYI, ne conduisez pas et ne participez pas à des activités nécessitant toute votre vigilance jusqu'à ce que vous sachiez comment le médicament vous affecte. L'utilisation d'ADDYI avec des médicaments dépresseurs peut augmenter le risque de sédation et de somnolence.
- Ne prenez pas ADDYI si vous avez des problèmes de foie.
- ADDYI ne devrait pas être pris en combinaison avec certains médicaments.
- Avant de prendre ADDYI, informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine douce, afin qu'il vous indique si le traitement par ADDYI est sécuritaire pour vous.

## Autres mises en garde que vous devriez connaître

- Les effets d'ADDYI n'ont pas été étudiés chez les femmes noires ou asiatiques ménopausées ni chez les femmes ménopausées en sous-poids.
- Si vous pesez moins de 50 kg, le risque de certains effets indésirables peut être plus élevé. Ces effets secondaires incluent une dépression du système nerveux central (sédation ou sensation de somnolence), une baisse de pression sanguine et des évanouissements. Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous ressentez ces effets.
- Attendez au moins deux heures après avoir bu une ou deux consommations standard d'alcool\* avant de prendre ADDYI au coucher. Si vous buvez trois consommations d'alcool ou plus le soir, sautez votre dose d'ADDYI au coucher. Après avoir pris votre ADDYI au coucher, ne buvez pas d'alcool avant le lendemain.
- ADDYI peut causer une hypotension, un évanouissement (perte de conscience) et de la somnolence, ce qui peut nuire à votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Vous devriez attendre au moins six heures après avoir pris ADDYI avant de conduire ou d'utiliser des machines. Soyez particulièrement prudente si vous conduisez le matin suivant la prise d'ADDYI, jusqu'à ce que vous sachiez comment vous réagissez à ce médicament.
- NE buvez PAS de jus de pamplemousse pendant le traitement par ADDYI.

\* Voici des exemples équivalents à une consommation standard d'alcool : une bière régulière de 350 mL (5 % d'alcool); 150 mL de vin (12 % d'alcool); 45 mL d'alcool fort ou distillé (40 % d'alcool).

# Effets secondaires possibles


Comme c'est le cas avec tout médicament, vous pourriez ressentir certains effets secondaires en prenant ADDYI.

Les effets secondaires peuvent comprendre :

- étourdissements
- sueurs nocturnes
- indigestion
- vertiges
- difficulté à s'endormir ou à rester endormie
- douleurs abdominales
- nausées, vomissements
- bouche sèche
- maux de tête
- spasmes musculaires
- anxiété
- rêves anormaux
- enflure des mains et des jambes
- diarrhée
- éruption cutanée
- somnolence, fatigue
- constipation
- acné

**Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet secondaire inattendu, consultez votre professionnel de la santé.**

**Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la partie « Renseignements destinés aux patientes » de la monographie d'ADDYI.**



Vous n'êtes  
pas seule



Pr **addyi**<sup>®</sup>  
(flibansérine)  
comprimés de 100mg

Parlons  
de l'éléphant  
dans la pièce!



Pour en savoir plus sur ADDYI et le trouble lié à la baisse du désir sexuel, utilisez le numéro d'identification du médicament (DIN) indiqué sur votre flacon d'ADDYI pour accéder au site Web [addyi.ca](http://addyi.ca), ou parlez à votre professionnel de la santé.

**SEARCHLIGHT**  
PHARMACEUTIQUE

Pharmaceutique Searchlight Inc.  
1600, rue Notre-Dame Ouest, bureau 312  
Montréal, Québec H3J 1M1  
[www.searchlightpharma.com](http://www.searchlightpharma.com)

ADDYI est une marque déposée.  
© Pharmaceutique Searchlight Inc. 2021  
Imprimé au Canada – Avril 2021

